

b D = 18 m, P = -10 m

Petit gouffre qui s'est ouvert en 1963 dans un pré. Puits de 7 m se terminant sur un talus d'éboulis; à la base de ce dernier, un laminoir de quelques mètres permettait d'accéder dans un second puits profond de 3 m.

c Argovien

i Cavité actuellement comblée

j S. Dick et R. von Kaenel, 1.9.1963.

38.5. Grotte de la VIRE

a f.1144 - 561,800/216,020 - 1050 m

Pertuis

40. DOMBRESSON

40.1. Grotte aux AMBLYTÈLES (fig. 82)

a f.1144 - 561,950/216,050 - 1110 m

Pertuis

Cette petite grotte est d'un accès assez malaisé. Pour l'atteindre, il faut monter en face du restaurant en direction du sommet du flanc est de la cluse; parvenu aux deux tiers de la pente, il faut traverser le fil de l'arête d'où une vire quelque peu délicate permet d'accéder à la grotte qui s'ouvre dans un renforcement de la paroi. Au départ de la vire, une grotte minuscule est visible.

b D = 21 m

Entrée spacieuse (2,50 × 2,50 m) suivie d'un couloir unique coudé.

c Séquanien

d Le sol de la cavité est constitué par un matériau de remplissage peu épais, de petit calibre, argilo-terreux et très sec; plus on avance dans la grotte, plus le remplissage devient grossier et humide. Le fond de la galerie est obstrué par de gros blocs.

g De 1956 à 1960, la grotte a fait l'objet de fouilles non méthodiques. Les restes osseux très fragmentés découverts ne présentent pas un grand intérêt. JÉQUIER (1961) qui a étudié le matériel extrait y a constaté la présence, entre autres du *Loup* et surtout de l'*Ours brun* (9 individus dont 8 jeunes). Selon ce même auteur, les ossements découverts dans la grotte aux Amblytèles sont attribuables à une faune post-glaciaire, voire médiévale (faible profondeur du gisement, présence d'animaux domestiques).

Les vestiges d'un muret de pierre sèche à l'entrée de la grotte font penser que celle-ci a dû servir d'abri à une époque assez récente.

h Hymenoptera: *Amblyteles armatorius*

Dix mètres au-dessus de l'entrée du gouffre de Pertuis; accès malaisé en suivant une vire passant au-dessus du porche de cette dernière cavité.

b D = 10 m

Porche de 1,5 × 2 m, galerie unique coudée, horizontale, longue de 10 m.

c Séquanien

g Sondage infructueux

j J.-P. Tripet et R. von Kaenel, 26.4.1959

k E.1

l AUDÉTAT 1961-63; GIGON, GUYOT, TRIPET et VON KAENEL 1959.

Chiroptera: *Barbastella barbastellus*,
Eptesicus serotinus, *Myotis bechsteini*, *Myotis d. daubentoni*,
Myotis e. emarginatus, *Myotis m. myotis*, *Myotis m. mystacinus*,
Myotis n. nattereri, *Plecotus a. auritus*, *Rhinolophus h. hipposideros*

Tous les Chiroptères mentionnés ci-dessus ont été déterminés à partir de vestiges osseux récoltés au cours des fouilles.

k E. (corde de 50 m utile) 1

l AELLEN et STRINATI 1956, 1962; AUDÉTAT 1961-63; GIGON et VON KAENEL 1958-59; JÉQUIER 1961; STRINATI 1966.

40.2. Grotte du BLAIREAU (fig. 82)

(gr. Sermet)

a f.1144 - 561,765/215,960 - 1130 m

Pertuis

Dans le flanc ouest de la cluse; remonter la « coulisse » principale jusqu'au point où il est possible d'atteindre une autre « coulisse » descendant vers l'est et impraticable à sa base. La grotte du Blaireau s'ouvre presque au sommet de cette seconde « coulisse », sur son flanc nord.

b D = 28 m

Galerie unique, basse (1 à 1,20 m) jusqu'à 14 m de l'entrée puis boyaux se terminant devant des fissures impraticables.

c Kimméridgien

d Eboulis, terre et quelques concrétions dont une stalagmite.